

Informationen Harnblasenkrebs

(Quelle: Bericht zum Krebsgeschehen in Deutschland 2016, Robert Koch Institut)

Häufigkeit:

- 2013: 7.210 neu erkrankte Frauen, 22.270 neu erkrankte Männer in Deutschland (inklusive nicht-invasiver Karzinome)
- Mittleres Erkrankungsalter: 73,4 Jahre bei Frauen, 71,9 Jahre bei Männern
- Inzidenz für Krebserkrankungen der Harnblase hat sich in Deutschland für beide Geschlechter nach einem kontinuierlichen Anstieg über mehr als drei Jahrzehnte in den letzten Jahren stabilisiert

Symptome:

- Schmerzlose Blutung aus der Blase – Urin ist rötlich oder braun verfärbt
- Verstärkter Harndrang
- Gefühl einer Blasenentzündung
- Schmerzen im Unterleib und Nierengegend
- Vergrößerung der Lymphknoten, Stauungen und Schwellungen der Lymphbahnen und Venen
- Knochenschmerzen bei fortgeschrittener Erkrankung

Diagnostik:

- Tastuntersuchung
- Laboruntersuchung einer Urinprobe
- Ultraschalluntersuchung
- Blasenspiegelung

Therapie:

- Operative Entfernung
- Chemotherapie vor oder nach der Operation
- Strahlentherapie

Risikofaktoren:

- Rauchen, auch Passivrauchen
- Chronische Harnblaseninfektionen durch wiederkehrende Harnwegsinfektionen, Blasensteine oder Dauerkatheter
- Bilharziose: verbreitete Infektionskrankheit in tropischen Gebieten
- Chemische Substanzen: chronischer Kontakt mit z.B. chemischen Substanzen in der Gummiindustrie
- Medikamente: einige Medikamente begünstigen die Entstehung von Blasenkrebs

5-Jahres-Überlebensrate:

- 72 % bei Frauen, 77 % bei Männern